

医療機関使用欄

ジェミーナ®配合錠服用開始日

年 月 日

ジェミーナ®配合錠に関するお問い合わせ

ノーベルファーマ株式会社 カスタマーセンター 0120-003-140

【受付時間】 平日9:00～18:00（土・日・祝日、会社休日を除く）

メールでのお問い合わせ customercenter@nobelpark.jp

患者携帯カード 月経困難症治療剤

ジェミーナ®配合錠を服用している方へ

- ジェミーナ®配合錠を服用すると、**血栓症（血管内に血のかたまりが詰まる病気）**を発現する可能性があります。
- 血栓症の早期発見のためにも**定期的な診察**を受けてください。
- 次のような症状があらわれた場合は、**すぐに飲むのをやめて救急医療機関を受診**してください。

- 突然の足の痛み・腫れ
- 手足の脱力・まひ
- 突然の息切れ、押しつぶされるような胸の痛み
- 激しい頭痛、舌のもつれ・しゃべりにくい
- 突然の視力障害（見えにくいところがある、視野が狭くなる）など

他の診療科、医療機関を受診する際には、
このカードを必ず提示してください。

D4

患者携帯カード 月経困難症治療剤

ジェミーナ®配合錠を服用している方へ

- 次のような症状があらわれた場合は、症状が軽くても**飲むのをやめてすぐに医師に相談**してください。

足の痛み・腫れ・しびれ・発赤・ほてり、頭痛、吐き気・嘔吐（おうと） など

- 次のような状態になった場合、**飲むのをやめてすぐに医師に相談**してください。

体を動かさない、脱水 など

長時間同じ姿勢でいたり、水分が不足したりすると血栓症が起こりやすくなります。
適度に体を動かしたり、こまめに水分をとるようにしましょう。

受診医療機関の先生方へ

- この患者さんはジェミーナ®配合錠（卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤）を服用しています。
- 患者さんが本カードの赤枠内に記載されている症状を訴えて受診した場合には、卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤に関連した**血栓症*の可能性を念頭においた診察**をお願いします。
※主に下肢静脈血栓症、肺血栓塞栓症、まれに頭蓋内静脈洞血栓症、脳梗塞、腸間膜血栓症、網膜血栓症、心筋梗塞等
- 異常な症状があれば必要に応じて処方医にご相談ください。