

連絡カード

私は難治性脈管腫瘍・難治性脈管奇形の患者です

難治性脈管腫瘍・難治性脈管奇形の治療を受けています

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> リンパ管腫(リンパ管奇形) | <input type="checkbox"/> リンパ管腫症 | <input type="checkbox"/> ゴーハム病 |
| <input type="checkbox"/> リンパ管拡張症 | <input type="checkbox"/> 血管内皮腫 | <input type="checkbox"/> 房状血管腫 |
| <input type="checkbox"/> 静脈奇形 | <input type="checkbox"/> 青色ゴムまり様母斑症候群 | |
| <input type="checkbox"/> 混合型脈管奇形 | <input type="checkbox"/> クリッペル・トレノナー・ウェーバー症候群 | |

ラパリムス錠・顆粒を(空腹時・食後)に1日1回服用しています。

- 服用しているラパリムス錠・顆粒には併用禁忌、併用注意や相互作用に関する薬剤が多くありますので、他の薬剤と併用する場合はご注意をお願いします。
- ラパリムス錠・顆粒の主な副作用として口内炎や下痢、感染症、皮膚障害などがあります。
- 重大な副作用として間質性肺疾患が知られています。呼吸器症状があらわれた場合は副作用を疑ってください。

治療を受けている医療機関

医療機関名・診療科

住所

電話

医師名

(ふりがな)

氏名

(生年月日)

年 月 日)

ノーベルファーマ株式会社

RPA-032-DR
2024年1月作成

連絡カード

私は難治性脈管腫瘍・難治性脈管奇形の患者です

難治性脈管腫瘍・難治性脈管奇形の治療を受けています

リンパ管腫(リンパ管奇形) リンパ管腫症 ゴーハム病
リンパ管拡張症 血管内皮腫 房状血管腫
静脈奇形 青色ゴムまり様母斑症候群
混合型脈管奇形 クリッペル・トレノナー・ウェーバー症候群

ラパリムス錠・顆粒を(□空腹時・□食後)に1日1回服用しています。

●服用しているラパリムス錠・顆粒には併用禁忌、併用注意や相互作用に関する薬剤が多くありますので、他の薬剤と併用する場合はご注意をお願いします。
●ラパリムス錠・顆粒の主な副作用として口内炎や下痢、感染症、皮膚障害などがあります。
●重大な副作用として間質性肺疾患が知られています。呼吸器症状があらわれた場合は副作用を疑ってください。

治療を受けている医療機関

医療機関名・診療科

住所

電話

医師名

(ふりがな)
氏名 (生年月日 年 月 日)
ノーベルファーマ株式会社

RPA-032-DR
2024年1月作成